



Halálesetek száma halálokok szerint, 1999 (KSH)



Halálesetek száma (elkerülhető) halálokok szerint, 1999 (KSH)




Többen halnak meg dohányzás következtében, mint ahányan alkohol okozta betegségekben, kábítószer-túladagolásban, AIDS-ben és más fertőző betegségekben, közúti balesetekben, illetve gyilkosság és öngyilkosság miatt összesen.

A kockázatok DALY-értékei külön férfiakra (male) és nőkre (female) 2002-es értéken (Forrás: WHO 2003)

Rank	Males		Females	
	Risk factors	Total DALYs (%)	Risk factors	Total DALYs (%)
1	Dohányzás	25.5	Dohányzás	15.2
2	Alkohol	22.8	Magas vérnyomás	11.8
3	Magas vérnyomás	12.6	Magas Testtömegindex	9.1
4	Magas koleszterin szint	9.5	Magas koleszterin szint	8.1
5	Magas Testtömegindex	6.7	Alkohol	6.8
6	Alacsony gyümölcs és zöldség bevitel	6.2	Alacsony gyümölcs és zöldség bevitel	5.0
7	Fizikai inaktivitás	3.8	Fizikai inaktivitás	3.9
8	Ólom	1.1	Nem biztonságos szex	2.1
9	Szennyezett injekciók eü ellátás folyamán	1.0	Dohány füst	1.2
10	Illegális drogok	1.0	Gyerekkori szexuális zaklatás	1.0

Felnőtt alkohol-fogyasztás, 15 év feletti




Alcohol-related Harm in Europe – Key data October 2006 (European Commission, Health & Consumer Protection, Directorate General)

Az alkohol-fogyasztás számos megbetegedés kialakulásának kockázatát növeli


- - emlőrák;
 - - egyes fej-nyaki tumorok;
 - - emésztőszervi daganatok, különösen a gyomorrák;
 - - májrák;
 - - coronaria-betegség;
 - - agyi érbetegségek;
 - - májcirrózis;
 - - hasnyálmirigy-gyulladás;
 - - alacsony születési súly és méhen belüli növekedési retardáció;
-

-
- A 100.000 lakosra jutó alkoholos eredetű halálozás Magyarországon 129,47 volt 2005-ben, ugyanez a szám Csehországban 80,96, Szlovákiában 90,55 és 89,47 Lengyelországban, az Európai Unió 25 átlagában pedig 65,79 (beleszámítva a 2004-ben csatlakozott országok adatait is).
 - Százezer férfira vonatkoztatva 211,36 a 2005. évi magyarországi adat, ugyanez 125,42 Csehországban, 149,64 Lengyelországban, 152,95 Szlovákiában és 101,71 az EU-átlagban.
 - Magyarországon az alkoholos eredetű halálozás a teljes lakosságban és mindkét nem körében is közelítőleg kétszerese az EU-átlagnak, és csaknem 50%-kal meghaladja a velünk együtt az EU-hoz csatlakozott ún. visegrádi országok adatait is.
 - A teljes európai összehasonlításban csak a Szovjetunió egyes volt tagországaiban magasabb


SMR (0-64 évesek), férfiak, Ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganata, 100.000 főre




SMR (0-64 évesek), férfiak, nyelőcső rosszindulatú daganata, 100.000 főre



SMR (0-64 évesek), agyi érbetegségek, 100.000 főre



SHR/100.000 fő, krónikus májbetegség és cirrhosis, 0-64 év férfiak



Alkoholfogyasztáshoz köthető halandóság Magyarországon

